

La diálisis peritoneal (PD) requiere incorporar nuevas tareas a su vida cotidiana. Si tiene un compañero para la PD, deberán acordar quién hará cada tarea. **Es mejor para los dos si la persona que recibe la diálisis (paciente dializado) hace tanto del tratamiento como pueda.** Esto puede ayudar a evitar que el compañero se agote. Pueden cambiar quién hace qué cosas con el tiempo. **NOTA:** Esta es una lista larga. ¡No entre en pánico! Aprenderá los detalles de cada tarea durante la capacitación.

CÓMO UTILIZAR EL PATH-D: PD

- Imprima dos copias.
- Usted y su compañero de cuidado deben llenar una cada uno.
- Comparen las listas para ver en qué están de acuerdo.
- Hablen sobre las tareas en las que no están de acuerdo.
- Conserven las listas. Vuelvan a contestarlas ocasionalmente si cambian sus circunstancias.

Yo soy el: **Paciente dializado** **Compañero**

Fecha: _____

Puedo visualizarme haciendo hasta este porcentaje del tratamiento del PD (encierre el porcentaje):

| 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |

Tarea	Quién hará la tarea		
	Paciente dializado	Compañero	Ambos
1. Ordenar, llevar el control y almacenar los suministros.			
2. Reunir las bolsas que necesitarán para el tratamiento.			
3. Levantar las bolsas al atril para IV o a la cicladora.			
4. Tomar los signos vitales (presión arterial, pulso, temp. y peso).			
5. Tomar nota de los problemas o síntomas.			
6. Configurar la cicladora (si se usa) y verificar que está lista para usar.			
7. Revisar y limpiar el punto de salida del catéter de PD.			
8. Conectar el catéter de PD al tubo flexible.			
9. Capturar los parámetros del tratamiento e iniciar el tratamiento.			
10. Responder a todas las alarmas que puedan ocurrir.			
11. Desconectar el catéter cuando termine el tratamiento.			
12. Llevar registros y enviarlos a la clínica.			
13. Limpiar la parte exterior de la cicladora (si se usa).			
14. Quitar las bolsas de basura y desecharlas.			
15. Vaciar las bolsas de drenado y desecharlas.			
16. Desmontar y limpiar la cicladora (si se usa).			
17. Tomar y llevar el control de los medicamentos.			
18. Limpiar con cloro los drenajes que se usan para el líquido de la PD.			
19. Limpiar con cloro la regadera (para evitar infecciones).			
20. Estar disponible cuando se entreguen los suministros.			